Phoca PDF

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

ارائه می گردد .

دکتر زهرا دستجردی مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیرواگیرنیزیادآورشد : بنا بر آمار بنیاد بین‌المللی پوکی استخوان، از هر 2 زن و هر 4 مرد بالای 50 سال یک نفر شکستگی ناشی از استئوپروز را تجربه می کند . پوکی استخوان منجر به کاهش کیفیت زندگی و بار مالی سنگین برای نظام‌های بهداشت و درمان کشورها می‌شود. با تشخیص به‌موقع این بیماری قبل از شکستگی و با درمان زودهنگام و مدیریت درمان بیماران می‌توان از پوکی استخوان جلوگیری کرد .

دکتر دستجردی با معرفی سامانه خود ارزیابی خطر پوکی استخوان گفت: این سامانه ریسک فاکتور های خطر پوکی استخوان برای هر فرد را بررسی می کند و همشهریان عزیز می توانند به این سامانه مراجعه نموده و بعد از خود ارزیابی در صورت داشتن عوامل خطر پوکی استخوان جهت بررسی بیشتر به پزشک مراجعه نمایند .

برای آگاهی از وضعیت ریسک فاکتورهای پوکی استخوان، لطفا به سوالات در لینک زیر پاسخ دهید .

http://osteoday.ir/risk_check

2 / 2

Phoca PDF