دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشت از ادغام نوبت دوم واکسن تزریقی فلج اطفال در برنامه کشوری ایمن سازی خبر داد .

فلج اطفال عفونت ویروسی به شدت مسری است که عمدتا در کشور های با آب و هوای معتدل رخ می دهد . عامل این بیماری ویروس پولیومیلیت است که به سه شکل شناخته شده است و در جمعیت غیر واکسینه تقریبیا هر فردی را آلوده می کند . بیشترین عارضه عصبی شناخته شده از این ویروس تیپ 1 آن است .

در غیاب برنامه های کنترلی موثر با استفاده از واکسن ، به طور کلی از هر 200 مورد مواجهه با ویروس یک مورد منجر به بیماری فلجی شده که در اکثر موارد سبب ناتوانی دائمی شده و 5 تا 10 درصد موارد فلجی منجر به فوت می شود .

مهندس غلامحسین نوروزی نژاد ادامه داد: هشتم شهریور ماه 1394 دستورالعمل ادغام واکسن تزریقی فلج اطفال در برنامه جاری ایمن سازی کشور ابلاغ شد و در حال حاظر کلیه کودکان 4 ماهه این واکسن را دریافت می کنند . بر اساس توصیه سازمان جهانی بهداشت و مصوبه کمیته کشوری ایمن سازی ، نوبت دوم این واکسن در 6 ماهگی به برنامه کشوری ایمن سازی اضافه شده است . و از 1/10/99 در استان های

1 / 2
Phoca PDF

[illegible]

Phoca PDF