دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه بیماری گفت: باتوجه به شروع فصل گرما ومیزان آلودگی بالای دام ها به کنه، احتمال بروز بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در منطقه افزایش می یابد.

دکتر زهرا دستجردی گفت: بر همین اساس جلسه ای با عنوان کمیته تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) در معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور شکل گرفت.

وی افزود: تب خونریزی دهنده کریمه کنگو یک بیماری ویروسی واگیر بین انسان و دام (زئونوز) است که عامل انتقال و مخزن اصلی آن نوعی کنه به نام هیالوما است. علایم بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو تب بالا، سردرد، ضعف، تهوع، درد شکم و اسهال است.

دکتر زهرا دستجردی جهت پیشگیری از ابتلا به این بیماری افزود: جایگاه نگهداری دام باید از محل زندگی دور باشد، از تماس مستقیم با ترشحات، خون و یا لاشه دام پرهیز شود، از تماس مستقیم با کنه و له کردن آن با دست خود داری شود، از ذبح دام در محل های غیر مجاز خارج از کشتارگاه پرهیز شود، از مصرف گوشت های غیر مجاز خود داری شود و همچنیین گوشت ها 24 ساعت و دل، جگر و قلوه بعد از 48 ساعت پس از ذبح دام در دمای معمولی یخچال نگهداری و سپس مصرف شود.

این مقام مسئول ادامه ادامه داد: در این جلسه در خصوص وضعیت بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در کشور، استان خراسان رضوی و نیشابور، راه های انتقال و پیشگیری آموزش های لازم ارائه گردید و مشکلات و موانع کنترل

1 / 2

Phoca PDF

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

بیماری توسط نماینده اداره دامپزشکی مطرح شد .

این جلسه با حضور نمایندگان ادارات دامپزشکی و شهرداری ، مدیران و کارشناسان معاونت بهداشت و درمان ، شبکه بهداشت و درمان زبرخان ، کارشناس کنترل عفونت بیمارستان حکیم برگزار گردید .

2 / 2

Phoca PDF