

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشت از برگزاری دومین کمیته طبقه بندی موارد مشکوک به فلج شل حاد در سال جاری خبر داد .

دکتر زهرا دستجردی بیان کرد : با اشاره به اینکه بیماری فلج اطفال عفونت ویروسی به شدت مسری است که عمدتا در کشور های با آب و هوای معتدل رخ می دهد کلیه افرادی که بدون سابقه تروما و ضربه دچار فلج ناگهانی اندام می شوند بایستی مورد بررسی قرار گیرند .

این مقام مسئول افزود : واکسن‌ها برای افزایش قدرت دفاعی بدن استفاده می‌شوند و با تزریق واکسنی که حاوی بخشی از ویروس یا ویروس کشته شده است سیستم ایمنی تحریک و با تولید آنتی بادی شرایطی ایجاد می شود که در صورت مواجهه با ویروس اصلی می‌تواند دفاع خوبی از بدن داشته باشد و بیماری با عارضه کمتری تظاهر کند بنابراین هر واکسنی که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تزریق می‌شود مؤثر و خوب است.

وی در ادامه تصریح کرد : با توجه به انجام واکسیناسیون کودکان از سال 1363 و دادن قطره خوراکی فلج اطفال و شروع تزریق واکسن فلج اطفال از شهریور ماه 1394 موفق به مهار بیماری فوق در کشورمان شده ایم و آخرین مورد فلج اطفال در آذر ماه 79 در ایران مشاهده شده است و تا کنون ایران

1 / 2

Phoca PDF

[illegible].

[illegible]:
[illegible].

[illegible]:
[illegible].

[illegible] 8 [illegible].

Phoca PDF