[illegible]

[illegible]

Phoca PDF

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

مدفوع، به سه زیر گروه اسهال حاد (کمتر از 14 روز)، اسهال پایدار (14 روز یا بیشتر) و اسهال خونی طبقه بندی می شود.

در ادامه عزت بادیانی کارشناس واحد سلامت کودکان معاونت بهداشت با اشاره به اهمیت انجام اقدامات درمانی به موقع گفت: درصورت وجود کم آبی در کودکان، اقداماتی مانند دادن مایعات اضافی هر قدر که کودک تمایل دارد، تغذیه مرتب با شیر مادر در کودکان زیر 2 سال، استفاده از پودر او آر اس، پرهیز از مصرف مایعات شیرین مثل نوشابه و آبمیوه های صنعتی، دادن مکمل روی و تهیه غذاهای آبکی مانند سوپ، ماست و دوغ در کودکان بالای 6 ماه باید مد نظر قرار گیرد.

بادیانی تصریح کرد: در مواردی که کودک دچار کم آبی شدید و یا دچار اسهال پایدار شدید می شود بایستی بلافاصله پس از شروع او آر اس، کودک به نزدیکترین مرکز بهداشتی و درمانی ارجاع شود. مادران عزیز باید توجه داشته باشند پس از شروع درمان در صورتی که اسهال کودک هنوز متوقف نشده (3 بار و بیشتر در روز ادامه دارد)، جهت ارزیابی مجدد وضعیت کودک به نزدیکترین خانه بهداشت، پایگاه سلامت یا مرکز بهداشتی و درمانی مراجعه نمایند.

دکتر مردانی در پایان خواستاردقت و توجه والدین، مراقبین سلامت ، بهورزان و بویژه پزشکان محترم در درمان این عارضه مهم شد.

2 / 2

Phoca PDF