دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی نیشابوراز جابه جایی مرکز مشاوره هپاتیت به کلینیک تخصصی عطار واقع در خیابان ارگ جنوبی (اسد آبادی) ، روبه روی پمپ گاز

خرداد

دکتر حسین زاده گفت: طی سال های اخیر شیوع هپاتیت B در ایران از بیش از 3درصد به 1 درصد در کل جمعیت کاهش یافته است. که البته با توجه به اینکه این بیماری در شکل مزمن آن سال ها فاقد علامت است میزان شناسایی در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علی رغم افزایش قابل توجه شناسایی بیماران طی 5 سال گذشته کمتر از 0.2 درصد یعنی 20 درصد شیوع کشوری است. یکی از مهمترین چالش ها در شناسایی بیماران انگ موجود در جامعه و نگرانی بیماران از افشای اطلاعات می باشد که خود باعث تأخیر در تشخیص و افزایش احتمال انتقال و بروز عوارض بیماری می شود

غلامحسین نوروزی نژاد رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر افزود : معاونت بهداشت راه اندازی مرکز

1 / 3

Phoca PDF

[illegible]

Phoca PDF

[illegible].
* [illegible] C [illegible] .Dots [illegible]
* [illegible] .C [illegible]
* [illegible] C [illegible] PCR [illegible] C [illegible].
* [illegible].
* [illegible] B، C [illegible].
* [illegible].
* [illegible] B [illegible].

Phoca PDF