دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

Virus Subtype*
% Influenza Pos.**
A (H1N1)pdm09
A (H3)
A (Not subtyped)
B
0-10
11-20
21-30
>30
Data not available
Not applicable
* when influenza positive samples >20
** when total number of samples tested >100

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی نیشابور از افزایش موارد آنفلوانزا در برخی از کشور ها در نیمکره جنوبی درهفته های اخیر خبر داد .

دکتر هادی حسین زاده بیان کرد : سازمان جهانی بهداشت به کشورها توصیه می کند چرخش همزمان ویروس آنفلوانزا sars-cov-2 را در نظام مراقبت ادغام یافته رصد کنند. در این راستا ضروری است پزشکان ضمن بررسی بیماران، آنفلوانزا را درتشخیص افتراقی، به ویژه درگروه های پرخطر مورد ملاحظه قرار داده و طبق دستورالعمل های ملی، آزمایش و درمان انجام شود

نوروزی نژاد رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر افزود : براساس گزارش آزمایشگاه ملی آنفلوانزا از 107 کشور، تعداد 265159 نمونه بررسی شده اند که 6147 مورد ازنظر آنفلوانزا مثبت بوده است . از موارد مثبت فوق، 67.4% نوع A و 32.6% نوع B ویروس آنفلوانزا بوده اند از میان موارد مثبت نوع A ویروس آنفلوانزا که ساب تیپ شده اند 74.3% موارد H1N1/A ، 25.7 % H3N2/A بوده اند

1 / 2

Phoca PDF

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

ویروس آنفلوانزای نوع B همگی lineage ویکتوریا بوده است .
در راستای مراقبت بیماری آنفلوانزا در شهرستان از ابتدای سال، 17 نمونه مثبت آنفلوانزا شناسایی شده است که از این تعداد 11 درصد مربوط به پایگاه دیده ور آنفلوانزا می باشد .

رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر در پایان گفت : رعایت مسائل بهداشتی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری های تنفسی و کرونا ازجمله استفاده از ماسک و تهویه درفضاهای سربسته و با احتمال آلودگی بالا توصیه می شود و بایستی از عادی انگاری شرایط باتوجه به شرایط منطقه ای اجتناب گردد .

2 / 2

Phoca PDF