دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

معاون بهداشت دانشگاه براهمیت واکسیناسیون هپاتیت «ب» تاکید کرد.

دکتر حامدجزجلالیان افزود: هپاتیت «ب» نوعی عفونت ویروسی است که می تواند باعث عفونت و التهاب کبد شود، عفونت هپاتیت «ب» منجر به مرگ و میر سالیانه ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در دنیا می شود و پیش بینی می گردد در حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون نفر در دنیا ناقل این ویروس باشند.

رئیس مرکزبهداشت نیشابور میزان انتقال ویروس از مادر به جنین در صورت ابتلای مادر را بالای ۹۰ درصد دانست وافزود: این انتقال ممکن است طی بارداری، هنگام زایمان یا بعد از آن رخ دهد. اما با تزریق همزمان ایمونوگلوبولین و واکسن در زمان تولد نوزاد متولد شده از مادر مبتلا، به کمتر از 5 درصد کاهش می یابد.

حسین نوروزی نژاد، مدیرگروه پیشگیری از بیماری های

1 / 2

Phoca PDF

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

واگیر نیز گفت: نوع حاد این بیماری در 95 درصد موارد در بزرگسالان خود به خود بهبود می یابد و این میزان در نوزادان به 10 تا 20 درصد کاهش می یابد. به عبارتی در صورت ابتلا نوزاد به این ویروس 80 تا 90 درصد آنها آلودگی را بصورت مزمن تا پایان عمر با خود خواهند داشت و نوع مزمن آن می‌تواند منجر به سیروز و حتی سرطان کبد شود.
مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماری ها در پایان تاکید کرد: در راستای پیشگیری از انتقال بیماری از مادر به نوزاد، تزریق واکسن هپاتیت «ب» بدو تولد در ساعات اولیه تولد، برای تمام نوزادان و انجام تست مخصوص در همه خانم های باردار از برنامه های وزارت بهداشت است.
مقام مسوول فوق ادامه داد: در راستای ارزیابی وضعیت اجرای واکسیناسیون هپاتیت «ب» در مراکز زایمان، کارشناسان بیماری های واگیر معاونت بهداشت از این مراکز بازدید و راهکارهای لازم برای بهبود این شاخص را ارایه می دهند.

2 / 2

Phoca PDF